

TRATTAMENTO DEGLI EMATOMI E DEL “DOLORE INTERCOSTALE” CON VENTOSE E MARTELLETTO A FIORE DI PRUGNO


Paolo Evangelista

www.paoloevangelista.it



Ricerca preliminare presentata al **CONGRESSO UNIFICATO Società Italiana Agopuntura –
Association Francaise Acupuncture.**

Stresa – 12-14 ottobre 2001 in collaborazione con: V.Marino, M.Gambino, C.Iacoboni.



DEFINIZIONE

- Raccolta di sangue in seno ai tessuti di cui provoca dissociazione.⁽¹⁾

1. Dizionario Medico E. Lauricella, pag. 532- USES, 1987.

- *“Quando c’è emorragia c’è stasi”* ⁽²⁾

2. Trattato sulle malattie febbrili da calore, Wu Youke, 1642.




“RIMUOVERE LA STASI DI SANGUE”: L’USO DELLA VENTOSA

- Zhio Hou Bei Ji Fang (*Prescrizioni nelle Emergenze*) dinastia Jin (281-341 d. C.)
- Alfieri A, *Enciclopedia Medica Italiana, Uses*, 13: 2022, 1986.



VANTAGGI

- Mancato ricorso al drenaggio chirurgico;
- Cicatrice!
- Semplicità della metodica.



SVANTAGGI

- Dolore
- Ecchimosi
- Rischio per l'operatore.



Cause e arruolamento

- evento traumatico;
- disturbi della coagulazione;
- Esclusi anche quelli formati oltre le 5 settimane prima.
- erosione di piccoli vasi da parte di un processo patologico neoplastico o ascessuale.




PROCEDURA

- DEPILAZIONE
- DETERSIONE
- PERCUSSIONE CENTRIPETA
- FORMAZIONE SOFFUSIONE EMATICA
- APPLICAZIONE VENTOSA “A FUOCO RAPIDO” O “A GETTO DI FUOCO”.
- 5-10 MIN.
- RIMOZIONE VENTOSA
- DETERSIONE.



Media = 41,6 giorni




■ CASI TRATTATI (44)

- 35 TRAUMATICI
- 9 IATROGENI
- ARTI INFERIORI (27),
GLUTEI (9),
DELTOIDE (4),
FRONTE (3),
MASTOIDE (1)

■ CONTROLLI (12)

- 8 TRAUMATICI
- 4 IATROGENI
- GLUTEI (8),
REGIONE
ORBITARIA (2),
COLLO (1),
TESTICOLO (1).



■ CASI TRATTATI

- Età 51,6 (20-81)
- Dimensioni medie 4,6 x 4,9 cm (3,2x3 - 9x9)
- Durata malattia all'arruolamento 15,5 gg (7-35)


■ CONTROLLI


- Età 38 (30-71)
- Dimensioni medie 3,5 x 3,8 cm (2x2 - 5x4)
- Durata all'arruolamento 25 gg (18-60)



Casi trattati


- Numero sedute 7 (3-14)
- Tutti risolti
- Tempo di risoluzione medio 10 giorni
- Nessuna interruzione
- Nessun effetto collaterale (sanguinamenti, infezioni)








Controlli

- Dei 6 controlli, 5 sono andati all'intervento chirurgico
- Reintervento (1)
- Infezione (1)
- Cicatrice (tutti), una deturpante.
























Conclusioni

- Metodica semplice e priva di rischi
- Evita l'intervento chirurgico
- Alta probabilità d'efficacia (100%)
- Riduzione dei costi (day Surgery).



TRATTAMENTO DEI DOLORI INTERCOSTALI CON VENTOSE E MARTELLETTO A FIORE DI PRUGNO





“DOLORE INTERCOSTALE”

■ CAUSE:

- CONTUSIONI;
- FRATTURA COSTALE;
- NEVRALGIE (NEVRALGIA POSTERPETICA);
- PATOLOGIE DELLA PLEURA E DEL PARENCHIMA POLMONARE
- PATOLOGIE VASCOLARI.








•CONTROLLI

• 7 CASI


•DURATA MEDIA 46,8 GIORNI




•TRATTATI

• 7 CASI

•DURATA MEDIA 7,1 GIORNI






TECNICA

- INDIVIDUARE CON CURA IL PUNTO DOLENTE;
- PERCUSSIONE CON MFP;
- APPLICAZIONE DI VENTOSA;
- 34VB/YANGLINGQUAN + 6MC/NEIGUAN CONTROLATERALI (MANIPOLAZIONE)
- 2-3 SEDUTE A SETTIMANA.





Localizzazione: nella depressione anteriore ed inferiore all'estremità distale della fibula.



